

## HOSPITAL REGIONAL TLALNEPANTLA

### SESIÓN INTERHOSPITALARIA

#### CASO CLÍNICO

13 DE AGOSTO DE 2014

#### FICHA DE IDENTIFICACION:

Femenino de 1 año 5 meses de edad. Originaria y residente del Estado de México.

#### ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Niegan antecedentes familiares de importancia.

#### ANTECEDENTES PERINATALES

Producto de la segunda gesta de madre de 27 años de edad al momento del embarazo. Con control prenatal desde el 2º mes, en 7 ocasiones. Concluye embarazo a las 41 SDG por parto eutócico, peso 3300 gr, talla 51 cm, Apgar 8/9. Alimentada al seno materno hasta el 4to mes de vida.

#### ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS

Habita en casa propia, cuenta con 2 habitaciones y todos los servicios, convive con padres, hermano y aves. Hábitos higiénicos y alimenticios de regular calidad. Toxicomanías en núcleo familiar negadas.

#### ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS

Quirúrgicos, alérgicos, transfuncionales, exantemáticas y crónico degenerativas negadas

#### PADECIMIENTO ACTUAL

Inicia 2 meses previos al ingreso con otorrea del oído izquierdo, amarillenta, fetida a la cual no se le dio tratamiento. Evolucionó a otorrea bilateral a las 3 semanas de las mismas características que se acompañaba con irritabilidad y fiebre no cuantificada. Acudió a su clínica familiar la cual le deja tratamiento con Amoxicilina Suspensión de 125mg a 5.5ml cada 8hrs por 10 días, con remisión parcial del cuadro. Por lo que es enviado al servicio de otorrinolaringología para valoración.

#### EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente consciente, irritable, con palidez leve de tegumentos, edad aparente menor a la cronológica, hipotrófica. Pupilas isocóricas, normoreflexivas. Dermatitis atópica, Pabellones auriculares y región periauricular con dermatitis seborreica periauricular. Otoscopia con conductos auditivos externos edematizados bilateralmente con otorrea amarillenta abundante, no se aprecian membranas timpánicas. Rinoscopia: Septum funcional, cornetes en ciclo, mucosa hiperemica. Orofaringe: Amígdalas grado I, sin descarga posterior, normocromica. Cuello: Cilíndrico y simétrico, traquea central, móvil, desplazable, sin adenomegalias, pulsos carotídeos homocrotos y sincrónicos.

Resto se verá en la sesión.