

**SESIÓN INTERHOSPITALARIA
HOSPITAL REGIONAL DE TLALNEPANTLA ISSEMYM**



Ficha de Identificación

- Nombre: JLH
- Género: Masculino
- Edad: 56 años
- Originario y residente: Edo. Méx
- Escolaridad: Preparatoria
- Ocupación: Vendedor

Antecedentes heredofamiliares

- Carga materna para DM2, hermana viva con DM2

Antecedentes personales no patológicos

- Habita en casa propia, cuenta con todos los servicios básicos de urbanidad
Tabaquismo negado, alcoholismo social. IVSA 17 años, NPS: 4

Antecedentes personales patológicos

- DM2 de 20 años de evolución con tratamiento a base de insulina NPH
- HAS desde hace 3 años en tratamiento con Amlodipino 5mg c/12 hrs
- Enfermedad renal crónica de 5 años de diagnóstico en tratamiento con diálisis peritoneal
- Quirúrgicos positivo hace 5 años secundario a colocación de catéter Tenckhoff
- Hospitalizaciones: Hace 15 años en INCAN por Linfoma, recibiendo tratamiento con dos ciclos de quimioterapia con COP y posteriormente tres ciclos de CHOP

Padecimiento actual

- Presenta desde hace 8 meses aumento de volumen cervical izquierdo, de crecimiento lento, doloroso a la palpación acompañado de astenia, adinamia, mialgias principalmente en extremidades inferiores, artralgias y pérdida de peso de aproximadamente 20 Kg.
- Hace dos meses se agrega la aparición de máculas hiperpigmentadas en extremidades inferiores, superiores, espalda y tórax; hace 2 semanas se presenta lesión blanquecina en punta de lengua, dolorosa, asociada a disfagia a sólidos y líquidos.

Exploración física

- FC 88 FR 18 TA 120/70 Temp 37 Peso 55Kg
- Piel con lesiones maculares hiperpigmentadas de tamaño variable entre 2-3 mm, de forma circular, planas con bordes regulares, no confluentes, localizadas en extremidades superiores, inferiores, tórax y espalda.
- Otoscopía con CAEs permeables MT integras móviles
- Rinoscopía con septum anfractuoso funcional
- Orofaringe normocrómica sin descarga posterior
- Cavidad oral con piezas dentales en regular estado de higiene, lengua con movilidad conservada, presencia de dos lesiones blanquecinas amarillentas en tercio anterior, una de 2 cm de diámetro y la otra de 0.5 cm, con bordes eritematosos, irregulares y con zonas de aparente necrosis, dolorosa a la palpación.
- Cuello con adenomegalia submandibular izquierda de aproximadamente 3 cm, dolorosa a la palpación, fija a planos profundos, indurada, sin cambios en piel suprayacente, tráquea central y desplazable.
- Presencia de adenomegalias axilares y esplenomegalia.