



**SESIÓN INTERHOSPITALARIA. JUNIO 2015**  
**HOSPITAL CENTRAL MILITAR**

Masculino de 75 años de edad. Originario y Residente de San Martín Texmelucan, Pue. Escolaridad: primaria. Ocupación: zapatero. Edo civil: Casado. Religión: Católica.

**AHF:** Padre finado, desconoce la causa, Madre finada con antecedente de Diabetes Mellitus Tipo 2. Once hijos aparentemente sanos

**APNP:** Tabaquismo positivo desde los 18 años de edad y suspendido a los 30 años de edad a razón de 5 cigarrillos al día, etilismo ocasional fines de semana en ocasiones hasta llegar a la embriaguez. Zoonosis: positiva (perros y aves).

**APP:** Crónicos: Hiperuricemia de 15 años de diagnóstico, sin tratamiento, Diabetes Mellitus tipo 2 de 5 años de diagnóstico manejado con Insulina. Alergias: negadas. Quirúrgicos: Colectomía hace 10 años por antecedente de litiasis vesicular. Traumáticos: negados. Exposición a ambiente adverso: positivo a thinner, pegamento, piel de calzado desde los 15 años de edad hasta la fecha sin uso de protección.

**PA:** Inicia el 27 de marzo del presente año con cuadro de rinorrea hialina, obstrucción nasal derecha, retrodescarga y fiebre no cuantificada, manejado por médico particular sin respuesta al tratamiento, el 01 de abril presenta edema y dolor ocular derechos, acude a Clínica de su localidad donde se hospitaliza por 3 días y los familiares deciden su traslado al Hospital Central Militar.

**EF:**

Signos vitales dentro de parámetros normales.

**Ojos:** O.D. Agudeza visual No percibe luz.; Mov. Oculares todos limitados, Pupila Midriática, Conjuntiva hiperémica +++, Quemosis +.

**OI:** Agudeza visual 20/80, movimientos conservados, pupila normorrefléctica

**Oídos:** Conductos auditivos externos eurémicos, permeables, con membranas timpánicas íntegras, perladas, cono luminoso presente, mango de martillo normoinserito, pars flácida sin retracciones, móviles a las maniobras de Toynbee y Valsalva

**Nariz:** Pirámide central, Nasoendoscopia en fosa nasal nasal derecha se observa la presencia de masa necrótica, friable, que obstruye el 50% del pasaje, de característica friable, sésil, no pulsátil; fosa nasal izquierda, mucosa pálida, con presencia de puentes de moco hialino, cornetes eutróficos, desviación septal derecha en área II de Cottle.

**Cavidad oral:** con adecuada apertura, piezas dentales en mal estado, lengua, paladar blando y duro sin alteraciones, trigono retromolar sin lesiones visibles. Orofaringe eurémica, amígdalas intravélicas, úvula central.

**Cuello:** cilíndrico, simétrico, tráquea central, sin masas palpables, tiroides eutrófica, pulsos carotídeos homocrotos.