

SESIÓN INTERHOSPITALARIA Marzo 2015

FICHA DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: BJJC
EDAD: 24 años
GENERO: Masculino
ESTADO CIVIL: Casado
ESCOLARIDAD: Licenciatura
OCUPACIÓN: Contador
RELIGIÓN: Católica
ORIGINARIO: Estado de México

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES:

Madre viva y abuela materna finada con HAS.

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS:

Esquema de inmunizaciones completo.
Habitó tabaquismo y alcoholismo social.

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS.

*****ALERGIA A METAMIZOL*****

Varicela a los 6 años de edad sin secuelas ni complicaciones.

Toma de biopsia de "quiste" de conducto auditivo externo izquierdo hace 10 años, tratado en otra institución, sin complicaciones, no recuerda resultado histopatológico.

PADECIMIENTO ACTUAL:

Inicia hace 1 semana, sin causa aparente con la siguiente sintomatología:

- Otagia izquierda, tipo punzante, intensidad 8/10, sin irradiación, signo de trago positivo.
- Otorrea izquierda, amarillenta, fétida, sin exacerbantes ni atenuantes.
- Plenitud auricular sin exacerbantes ni atenuantes

Niega otorragia, síntomas vestibulares, cefalea, fiebre, ni alteraciones en la mímica facial.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Signos vitales: TA 110/70mmHg, FC 83x', FR 16x', temperatura 36.4°C.

Cara: simétrica, con adecuados movimientos faciales, con tono y fuerza muscular conservado.

Oído izquierdo: Adecuada implantación de pabellón auricular, con edema en concha, signo de trago positivo, conducto auditivo externo edematizado, que obstruye cerca del 90% de la luz, con detritus epiteliales que se aspiran sin complicaciones, no se visualiza membrana timpánica.
Oído derecho sin anomalías.

Nariz: Pirámide central, giba mixta, piel gruesa, septum con cresta basal anteroposterior izquierda no contactante.

Cavidad Oral: Adecuada apertura oral, mucosa hidratada, piezas dentales en adecuado estado, conductos de Wharton y Stenon permeables, amígdalas grado I, criptas cerradas, sin caseum, ni reacción periamigdalina, úvula central, pared posterior de orofaringe sin descarga.

Cuello: Cilíndrico, simétrico, tráquea central y desplazable, pulsos carotídeos homocrotos, sin agregados, no se palpa tiroides ni adenomegalias.

Se inicia tratamiento con mecha de gasa con mometasona, lidocaína y ciprofloxacino gotas la cual se extrae en dos días.

El resto del caso se revisará en la sesión.